

ARIA®

INSECTICIDA

Únicamente para operadores de control de plagas y uso comercial.

Apto para el control de plagas fitófagas en invernaderos, viveros y paisajes.

EPA Reg. N.º 71512-52-279 EPA Est. N.º 279-NY-1

Ingrediente activo:	En peso
Flonicamida.....	50.0%
Otros ingredientes:.....	50.0%
	100.0%

**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

Consulte otros paneles para conocer más información preventiva.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión	• Llame al Centro de Toxicología o a un médico de inmediato para recibir consejo sobre el tratamiento. • Pida a la persona afectada que beba un sorbo de agua, si puede tragar. • No provoque el vómito, a menos que el Centro de Toxicología o un médico le hayan indicado hacerlo. • No dé nada por la boca a una persona inconsciente.
Si entra en contacto con la piel o la ropa	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por unos 15 a 20 minutos. • Llame al Centro de Toxicología o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos	• Lave los ojos lento y suavemente con agua por 15 o 20 minutos con los párpados abiertos. • Quítese las lentes de contacto (si las usa) al cabo de 5 minutos y luego continúe con el enjuague. • Llame al Centro de Toxicología o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

NÚMERO PARA URGENCIAS

Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico, o cuando asista a un centro médico para tratamiento. También puede comunicarse al 1-(800)-331-3148 para recibir asistencia de emergencia.

NOTA AL MÉDICO

El tratamiento también se controla al retirar a la persona de la exposición, seguido de atención sintomática y de asistencia.

Llame al 1-800-321-1FMC (1362) para recibir soporte técnico o información sobre el uso de este producto.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Peligros para el ser humano y los animales domésticos

PRECAUCIÓN

Es perjudicial en caso de ingestión, inhalación o absorción a través de la piel. Provoca irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de usar el producto y antes de comer, beber, mascar goma o usar tabaco. Quítese y lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los encargados de aplicación y otros manipuladores del producto deben usar lo siguiente:

Camisa de manga larga y pantalones largos.
Guantes impermeables. Zapatos y medias.



FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104

Contenido neto: 5.64 onzas (160 gramos)

Requisitos de seguridad para el usuario del insecticida

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el EPP. Si no hay instrucciones específicas para los artículos lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado de otra ropa de uso común.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

Quite la ropa o el EPP de inmediato si el insecticida entró. Luego, lave completamente todas las prendas y póngase ropa limpia. Quite el EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lave el lado de afuera de los guantes antes de quitárselos. Lávese completamente y cámbiese la ropa usada por una limpia lo antes posible.

Peligros ambientales

No aplique directamente en el agua, o en áreas donde haya agua en la superficie ni áreas entre mareas por debajo de la media de pleamar alta. No contamine el agua cuando limpie lo deseche el agua de lavado o las sustancias de enjuague de los equipos.

Este producto es moderadamente tóxico para las abejas y otros insectos polinizadores expuestos al tratamiento directo, o a residuos en los cultivos o las malezas de producción. Siga las indicaciones de la etiqueta destinadas a minimizar el desplazamiento y reducir el riesgo para los insectos polinizadores.

Peligros físicos y químicos

No rocíe el producto en lugares donde podrían producirse cortocircuitos eléctricos, como toma corrientes, conductos, cajas de interruptores y carcasas del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera contraria a lo indicado en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

RESTRICCIONES DE USO

- Aplique este producto únicamente como se especifica en la etiqueta aprobada de la EPA y el etiquetado complementario.
- NO APLIQUE EL INSECTICIDA ARIA® POR MEDIO DE NINGÚN SISTEMA DE IRRIGACIÓN QUE ESTÉ CONECTADO FÍSICAMENTE A UN SISTEMA DE AGUAS PÚBLICO.
- No aplique este producto de manera tal que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea directamente o por desplazamiento. Solo los manipuladores del producto con protección pueden estar en el área durante su aplicación.
- No aplique en cultivos alimentarios (frutas, frutos secos o verduras).
- No aplique en los jardines de casas, invernaderos domésticos ni en entornos residenciales.
- No permita que los niños o las mascotas ingresen a áreas ni que entren en contacto con superficies tratadas con el producto hasta que estas se hayan secado.
- Este NO es un producto para uso residencial por propietarios.
- El uso de este producto en espacios interiores se limita a materiales de plantas decorativas administradas por profesionales y que crecen dentro de las áreas comunes de edificios comerciales, industriales e institucionales.
- Para conocer cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte a la agencia estatal o tribal responsable de las reglamentaciones sobre pesticidas.
- No aplique mediante avión.

AVISOS SOBRE LA DISPERSIÓN DE PESTICIDAS

EL ENCARGADO DE APLICACIÓN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE EVITAR LA DISPERSIÓN DEL PESTICIDA FUERA DEL LUGAR.

ESTÉ AL TANTO DE LOS LUGARES CERCANOS QUE NO SEAN OBJETO DE FUMIGACIÓN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Aplicaciones mediante tecnología manual:

- Tome las precauciones necesarias para minimizar la dispersión del insecticida.

LA IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DE LAS GOTAS

Una manera eficaz de reducir la dispersión del pesticida es aplicar gotas grandes. Utilice las gotas más grandes que permiten un control de plagas dirigido. Si bien la aplicación de gotas más grandes reducirá la dispersión del pesticida, el potencial de dispersión será mayor si las aplicaciones se realizan de manera incorrecta o en condiciones ambientales desfavorables.

Cómo controlar el tamaño de las gotas: barra pulverizadora terrestre

- Volumen: el aumento del volumen de pulverización para producir gotas más grandes reducirá la dispersión del pesticida. Utilice el volumen de pulverización más alto y práctico para la aplicación. Si necesita un volumen de pulverización mayor, considere usar una boquilla con un caudal mayor.
- Presión: utilice la presión de pulverización más baja recomendada para la boquilla para producir el volumen de pulverización y el tamaño de gota objetivo.
- Boquilla rociadora: utilice una boquilla rociadora que esté diseñada para la aplicación prevista. Considere usar boquillas diseñadas para reducir la dispersión.

ALTURA DE LA BARRA PULVERIZADORA - Barra pulverizadora terrestre

Para los equipos terrestres, la barra pulverizadora debe permanecer nivelada con el cultivo y tener un rebote mínimo.

PULVERIZADORES PROTEGIDOS

La protección de la barra pulverizadora o de las boquillas individuales puede ayudar a reducir la dispersión del pesticida. Considere usar pulverizadores protegidos. Verifique que las protecciones no interfieran con la sedimentación del rociador en el área objetivo.

TEMPERATURA Y HUMEDAD Cuando efectúe las aplicaciones en condiciones de frío y calor, opte por gotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación.

INVERSIONES TÉRMICAS El potencial de dispersión es alto durante una inversión térmica. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura en función de la altitud y son comunes por la noche, con nubosidad limitada y vientos leves a escasos. La presencia de una inversión térmica puede indicarse por nieblas de suelo o el movimiento de humo desde una fuente terrestre o un generador de humo de avión. El humo que forma capas y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (en condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que asciende y se disipa rápidamente es señal de una buena mezcla de aire vertical. Evite aplicaciones durante inversiones térmicas.

VIENTO El potencial de dispersión generalmente aumenta con la velocidad del viento. EVITE LAS APLICACIONES EN CONDICIONES DE RÁFAGAS DE VIENTO. Los encargados de aplicación deben estar familiarizados con los patrones de viento locales y del terreno que podrían afectar la dispersión del pesticida.

REQUISITOS PARA EL USO AGRÍCOLA

Utilice este producto únicamente de acuerdo con su etiquetado y la sección 170 de la norma de protección del trabajador CFR 40. Esta norma incluye requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y de los encargados de manipular los pesticidas agrícolas. Incluye requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en caso de emergencia. Además, incluye instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de la etiqueta sobre el equipo de protección personal (EPP) y el intervalo de ingreso restringido. Los requisitos que se plantean en este recuadro solo se aplican a los usos de este producto que estén contemplados en la norma de protección del trabajador. No ingrese ni permita el ingreso de un trabajador a las áreas tratadas durante el intervalo de ingreso restringido (REI) de 12 horas.

El EPP necesario para el ingreso temprano a las áreas tratadas que está permitido en función de la norma de protección del trabajador y que implica el contacto con todo aquello sobre lo que se aplicó el producto, como plantas, tierra o agua, es el siguiente: camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos y medias y guantes impermeables.

REQUISITOS PARA EL USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos que se exponen en este recuadro se aplican a los usos de este producto que NO están dentro del alcance de la norma de protección del trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR, sección 170). La norma de protección del trabajador se aplica cuando este producto se utiliza para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos. No permita que los niños o las mascotas ingresen a áreas ni que entren en contacto con superficies tratadas con el producto hasta que el rociado se haya secado.

Precauciones de uso en el interior (jardines interiores): El uso de este producto en jardines interiores se limita a materiales de plantas decorativas administradas por profesionales y que crecen dentro de las áreas comunes de edificios comerciales, industriales e institucionales. Una vez comprobada la compatibilidad, use el mismo procedimiento para añadir los ingredientes necesarios a la botella de pulverización. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas. No aplique cuando haya ocupantes en el área inmediata. Cubra las peceras antes de la aplicación. Aplique solo en plantas decorativas. No aplique a cultivos alimentarios.

Precauciones de uso en el exterior: Use una camisa de manga larga y pantalones largos para la aplicación. Rocíe con el viento detrás. No aplique en los días ventosos. Si la ropa se moja con el producto, quítela la ropa después de la aplicación, lave las áreas del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón y lave la ropa antes de volver a usarla. No aplique este producto por medio de un sistema de irrigación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El insecticida Aria® es una formulación granular dispersable en agua que contiene 8 onzas de flonicamida por libra que se usará para el control de plagas de plantas decorativas en invernaderos, jardines interiores, viveros y plantas ornamentales de paisajismo.

Este producto detiene la alimentación de insectos en un plazo de 30 minutos, aunque los insectos pueden permanecer en las plantas por hasta 5 días. Este producto ofrece un control residual excelente. El insecticida Aria® puede aplicarse como pulverizador foliar, pulverizador de amplia difusión o solución de empapado de tierra de forma manual o mediante quimigación. Cuando haga aplicaciones de solución de empapado, es posible que note un retraso en la eficacia de plantas más grandes o leñosas. Haga la aplicación antes de una infestación anticipada para lograr control.

Si se utilizan pantallas protectores, deben tener una malla de 50 o mayor.

MANEJO DE LA RESISTENCIA DE LOS INSECTOS

Para manejar la resistencia, el insecticida Aria® contiene un insecticida del Grupo 29. Las poblaciones de insectos pueden incluir individuos naturalmente resistentes al insecticida Aria® y a otros insecticidas del Grupo 29. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos si este grupo de insecticidas se utiliza repetidamente en los mismos campos. Se recomienda seguir las estrategias de manejo de resistencia apropiadas. Para reducir el potencial de desarrollar resistencia al insecticida, alterne con un insecticida con un modo de acción diferente. Controle las poblaciones de plagas tratadas para detectar la resistencia. Lea la etiqueta del producto antes de aplicar cualquier insecticida y siga las instrucciones indicadas.

Para retrasar la resistencia al insecticida, siga los pasos enumerados a continuación:

- Alterne el uso del insecticida Aria® u otro insecticida del Grupo 29 con grupos diferentes que controlen el mismo tipo de plagas. Evite aplicar mucho más que la tasa de uso máxima para la temporada o el número total de rociados consecutivos del insecticida Aria® por temporada.
- Use mezclas de insecticidas de un grupo distinto con la misma eficacia sobre la plaga objetivo, si dicho uso está permitido. No dependa de la misma mezcla repetidamente para la misma población de plaga. Tenga en cuenta posibles problemas conocidos de resistencia cruzada (para las plagas que tratará) entre los componentes individuales de una mezcla. Además, considere las recomendaciones que proporciona el Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas (IRAC).
- Los insecticidas individuales seleccionados para usar en mezclas deben ser altamente eficaces y aplicarse según la tasa de uso para la que están registrados en forma individual contra las especies determinadas.
- Las mezclas con componentes que tienen la misma clasificación de modo de acción IRAC no se recomiendan para el manejo de la resistencia al insecticida.
- Cuando utilice mezclas, tenga presente los posibles problemas conocidos de resistencia cruzada entre los componentes individuales de la plaga que va a tratar.
- Las mezclas pierden eficacia si la resistencia ya se está desarrollando en uno o más ingredientes activos, aunque todavía puede ofrecer beneficios para el control de plagas.
- Los beneficios de control de la resistencia del insecto de una mezcla insecticida son mayores si los dos componentes tienen períodos de actividad insecticida residual similares. Las mezclas de insecticidas con períodos desiguales de actividad insecticida residual pueden ofrecer el beneficio de control de la resistencia del insecto solamente por el período en que ambos insecticidas estén activos.
- Adopte un programa de manejo integrado de plagas para el uso de insecticidas que incluya exploración, información histórica relacionada al uso del pesticida, rotación de cultivos, mantenimiento de registros y que tenga en cuenta prácticas de control culturales, biológicas y de otros productos químicos.
- Haga un seguimiento después de la aplicación para descartar la supervivencia inesperada de la plaga tratada. Si el nivel de supervivencia sugiere la presencia de resistencia, consulte con un especialista de su universidad local o un asesor de control de plagas certificado.
- Comuníquese con su especialista de extensión local o asesores de cultivos certificados para conocer otras recomendaciones sobre el manejo de resistencia a insecticidas o el programa de manejo integrado de plagas de su lugar específico y los problemas de plagas en su área.
- Para obtener más información o reportar un caso de resistencia sospechosa, comuníquese con FMC Corporation al 1-800-321-1FMC (1362).

Instrucciones de mezclado

Lave exhaustivamente el equipo de pulverización antes de usar este producto. Use un equipo de medición calibrado para medir la cantidad necesaria del producto. En el momento de diluir, primero agregue aproximadamente la mitad del agua en el depósito pulverizador y luego agregue la cantidad necesaria de producto mientras agita. A continuación, llene el resto del tanque con agua y continúe agitando hasta que esté bien mezclado. Cada tanto, agite el pulverizador mientras lo está usando para asegurarse una cobertura pareja. Sacuda o vuelva a agitar el pulverizador antes del uso si se interrumpe la aplicación.

Instrucciones para mezcla en tanque

Cuando mezcle este producto en un tanque con otros pesticidas, observe todas las precauciones y limitaciones de cada etiqueta individual. La compatibilidad física de este producto puede variar con las distintas fuentes de productos pesticidas, así como con las prácticas culturales. La mezcla en tanque que no ha sido probada con anterioridad deberá probarse mediante la prueba de jarra que se describe a continuación. En una jarra con una capacidad mínima de un cuarto, agregue las cantidades proporcionadas de los productos en 1 cuarto de agua. Primero, agregue los polvos humectables y los productos granulares dispersables en agua y, luego, los fluidos y los concentrados emulsionables. Después de mezclar por completo, deje reposar unos 5 minutos como mínimo. Si la combinación se mantiene mezclada o

puede mezclarse de nuevo fácilmente, quiere decir que tiene compatibilidad física. Una vez comprobada la compatibilidad, use el mismo procedimiento para añadir los ingredientes necesarios a la botella de pulverización.

Si la mezcla es compatible físicamente, agregue la ½ de la cantidad de agua necesaria en el tanque de mezcla. Inicie el agitador antes de agregar los componentes de la mezcla al tanque. Agregue los productos en este orden: productos envasados con un empaque soluble al agua, polvos humectables, gránulos humectables (fluidos secos), fluidos líquidos, líquidos y concentrados emulsionables.

Siempre deje que cada componente del tanque se disperse por completo antes de agregar el producto siguiente. Agite lo suficiente mientras agrega el resto de agua. Mantenga la agitación hasta que toda la mezcla se haya aplicado.

Nota: Si usa este producto para mezclas en tanque, todos los productos con envases solubles en agua deben agregarse al tanque antes que cualquier otro componente de la mezcla, incluido este producto. Deje que el envase soluble en agua se disuelva por completo y que el producto se disperse en su totalidad antes de agregar cualquier otro componente de mezcla al tanque.

Si utiliza este producto para una mezcla en tanque, es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y cumpla con las restricciones y limitaciones aplicables y las indicaciones de uso de todos los productos involucrados en la mezcla en tanque. Los usuarios deben seguir las indicaciones de uso más restrictivas y las declaraciones preventivas de cada producto para la mezcla en tanque. Este producto no debe mezclarse con un producto que prohíba dicha mezcla.

No permita que la mezcla en tanque se asiente durante la noche.

Aplicaciones de quimigación

Aplice este producto por medio de microirrigación, irrigación por goteo, equipo de irrigación motorizado y calibrado o sistemas de irrigación que se mueven con la mano. No aplique este producto por medio de otro sistema de irrigación. No conecte ningún sistema de irrigación, incluidos sistemas de invernadero, usado para la aplicación de pesticida en un sistema de aguas público. La distribución no uniforme del agua tratada puede ocasionar daños en los cultivos o la falta de efectividad. Si tiene preguntas sobre calibración, debe comunicarse con los especialistas del servicio de extensión del estado, los fabricantes del equipo u otros expertos. Una persona conocedora del sistema de quimigación y responsable de su operación, o con la supervisión de la persona responsable, deberá cerrar el sistema y hacer los ajustes necesarios según corresponda.

El sistema debe tener una válvula de retención operativa, una válvula de alivio de vacío y un drenaje de baja presión ubicados apropiadamente en la tubería de irrigación para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo. La tubería de inyección de pesticida también incluye una válvula de retención de cierre rápido, automática y operativa para impedir que el caudal de líquido regrese a la bomba de inyección. La tubería de inyección de pesticida también debe tener una válvula de solenoide operativa, que esté normalmente cerrada, ubicada del lado de entrada de la bomba de inyección y conectada al bloqueo del sistema para impedir que el líquido salga del tanque de suministro cuando el sistema de irrigación esté cerrado automático o manualmente. El sistema debe tener controles de bloqueo operativos para cerrar automáticamente la bomba de inyección de pesticida cuando el motor de la bomba de agua se detenga. La línea de irrigación o bomba de agua debe tener un interruptor de presión operativo, que detendrá el motor de la bomba de agua cuando la presión de agua disminuya al punto en el que la distribución del pesticida se vea afectada negativamente.

Los sistemas deben usar una bomba medidora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej.: una bomba de diafragma) diseñada eficazmente y construida con materiales que sean compatibles con los pesticidas y capaz de instalarse en un bloqueo de sistema. El insecticida Aria® debe aplicarse de forma continua por el tiempo que dure la aplicación de agua. El insecticida Aria® debe diluirse en un volumen suficiente para asegurar la aplicación precisa sobre el área de tratamiento. Utilice la cantidad apropiada de agua para dirigir el producto a la plaga que va a combatir. Por lo general, no es necesario agitar si se utilizan los diluyentes adecuados. Debe realizar una prueba de diluyente para asegurarse de que la separación de fases no se produzca durante la dilución y aplicación. No lograr una dilución uniforme en el tiempo de aplicación puede dar como resultado un control menor al esperado.

Uso de agua de los sistemas de aguas públicos:

NO APLIQUE EL INSECTICIDA ARIA® POR MEDIO DE NINGÚN SISTEMA DE IRRIGACIÓN QUE ESTÉ CONECTADO FÍSICAMENTE A UN SISTEMA DE AGUAS PÚBLICO. El sistema de aguas público se refiere al sistema para la provisión al público de agua canalizada para el consumo humano, si dicho sistema tiene, por lo menos, 15 conexiones de servicio o abastece regularmente a un promedio de 25 individuos como mínimo a diario por un período de 60 días al año. El insecticida Aria® puede aplicarse a través de los sistemas de irrigación provistos por un sistema de aguas público únicamente si el agua del sistema hídrico se descarga a un tanque de reserva antes de la introducción del pesticida. Deberá haber una barrera física completa (separación de aire) entre el extremo de la boca de descarga de la tubería de relleno y el borde superior o de rebase del tanque de reserva de al menos el doble del diámetro interior de la tubería de relleno. Antes de comenzar con la quimigación, siempre asegúrese de que exista la separación de aire y que no haya ningún bloqueo del rebase del tanque de reserva.

APLICACIONES DECORATIVAS

Los usos en invernaderos y viveros están contemplados en los requisitos de la sección 170 de la norma de protección del trabajador CFR 40. Vea las instrucciones específicas de esta etiqueta respecto a la ropa de protección y otros requisitos conforme a la norma.

Apto para usar en plantas decorativas herbáceas y leñosas, anuales y perennes.

Aplique este producto en una proporción de 0.7 a 4.3 onzas (de 20 a 120 gramos) por cada 100 galones (consulte las proporciones y comentarios específicos de cada plaga en la tabla siguiente). Realice el tratamiento cuando los insectos aparezcan por primera vez. Use la proporción alta para infestaciones intensas. Puede utilizar un surfactante según sea necesario en la concentración indicada en la etiqueta. Repita las aplicaciones cada 7 a 28 días según sea necesario según la respuesta de la plaga y las prácticas de riego. Para una paralización mejorada de las infestaciones intensas, aplique como mezcla en tanque con un peritroide u otro material de rápida acción.

Plaga	Índice de producto por cada 100 galones	Índice de ingrediente activo por cada 100 galones	Comentarios
Áfidos tales como: Especie <i>Acyrtosiphon</i> Especie <i>Aphis</i> Especie <i>Dactynotus</i> Pulgón verde del melocotonero (<i>Myzus</i>) Especie <i>Macrosiphon</i> Especie <i>Rhopalosiphum</i>	De 20 a 60 gramos* De 0.7 a 2.1 onzas De 0.045 a 0.135 lb	De 0.022 a 0.067 lb de ingrediente activo (ai) De 10 a 30 gramos de ai De 0.35 a 1.05 onzas de ai	Vuelva a aplicar en un plazo de 7 a 28 días según sea necesario.
Tisanóptaros1 tales como: Trips occidental de las flores <i>Frankliniella occidentalis</i> Especies de tisanóptaros	De 60 a 80 gramos* De 2.1 a 2.9 onzas De 0.134 a 0.180 lb	De 0.067 a 0.090 lb de ai De 30 a 40 gramos de ai De 1.05 a 1.45 onzas de ai	Vuelva a aplicar en un plazo de 7 a 28 días según sea necesario.
Moscas blancas2 tales como: Mosca blanca de los invernaderos <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Mosca blanca de las batatas <i>Bemisia tabaci</i>	De 80 a 120 gramos* De 2.9 a 4.3 onzas De 0.180a 0.268 lb	De 0.090 a 0.134 lb de ai De 40 a 60 gramos de ai De 1.45 a 2.15 onzas de ai	Vuelva a aplicar en un plazo de 7 a 28 días según sea necesario.
Saltahojas Cochinillas harinosas Insectos de plantas Cochinillas Chinches del algodónero	De 60 a 120 gramos* De 2.1 a 4.3 onzas De 0.134 a 0.268 lb	De 0.067 a 0.134 lb de ai De 30 a 60 gramos de ai De 1.05 a 2.15 onzas de ai	Vuelva a aplicar en un plazo de 7 a 28 días según sea necesario.

*Una tapa equivale a 20 gramos
1Supresión de tisanóptaros en las flores. El mejor manejo se logró con la aplicación sobre el follaje cuando aparecieron por primera vez los insectos.
2Supresión de las moscas blancas de la hoja plateada. Se recomienda enérgicamente alternar o usar la mezcla en tanque con un producto de una clase química diferente para lograr un manejo óptimo de las moscas blancas.

El insecticida Aria® ha demostrado excelente seguridad en la mayoría de las plantas, aun así, no se ha probado completamente en todas las variedades de plantas. Cuando trate grandes cantidades de plantas de una sola variedad, o cuando trate material que no ha probado previamente, rocíe algunas plantas y observe la fitotoxicidad antes de hacer una aplicación a escala completa. Espere entre 5 y 7 días después del tratamiento para evaluar los resultados de la prueba.

Algunos cultivares de pensamiento han exhibido sensibilidad a la flonicamida. Antes de usar el producto en los pensamientos, aplique el insecticida Aria® según el índice de uso apropiado en una pequeña porción del cultivo de pensamientos (unas 10 unidades por variedad) y evalúe visualmente el impacto después de 7 a 10 días después de la aplicación.

Volúmenes recomendados de la solución de aplicación por acre para plantas decorativas en base a la altura

Altura de la planta	Volumen por acre
Hasta 1 pie	Hasta 25 galones
De 1 a 2 pies	50 gal
De 2 a 4 pies	100 gal

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamina el agua, los alimentos o pienso por almacenamiento o eliminación.

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar seco y fresco (idealmente cerrado, y evite el exceso de calor) al que no puedan acceder niños y animales. No guarde de manera que exista contaminación cruzada con otros pesticidas, fertilizantes, alimentos o pienso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Abra el recipiente con cuidado. Después del uso parcial, cierre herméticamente. En caso de derrame, evite el contacto, aisle el área afectada y mantenga alejados a los animales y las personas sin protección. Contenga los derrames. **Llame a CHEMTREC (Transporte y derrames): (800)-424-9300**

Para contener el derrame líquido, haga un dique alrededor del área o absorba con arena, arena para gato o arcilla comercial. Si es un material seco, cubra para evitar la dispersión. Coloque el paquete dañado en un recipiente contenedor. Identifique el contenido.

Eliminación de pesticida: Los residuos que resulten del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro de eliminación de residuos aprobado. La bolsa de aluminio vaciada puede conservar residuos del producto. Observe todas las protecciones de la etiqueta hasta que se destruyan los envases. No reutilice la bolsa de aluminio.

Eliminación del envase: Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. Vacíe el envase por completo en el equipo de aplicación. Enjuague tres veces el envase; luego, descártelo para reciclaje o reacondicionamiento, o perforélo y deséchelo en un relleno sanitario o mediante otros procedimientos permitidos por las autoridades locales y estatales.

Condiciones de venta y limitación de la garantía y responsabilidad legal:

AVISO: Lea completamente las Instrucciones de uso y las Condiciones de venta y limitación de la garantía y responsabilidad legal antes de comprar o usar este producto. Si los términos no son aceptables, directamente devuelva el producto, sin abrir. Se le reintegrará el precio de compra.

Debe seguir las instrucciones de uso de este producto atentamente. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados intrínsecamente con el uso de este producto. Pueden ocasionarse daños en el cultivo, falta de eficacia u otras consecuencias imprevistas debido a factores tales como el uso o la aplicación indebida, condiciones climáticas o del cultivo ajenas al control de FMC o el vendedor. Todos estos riesgos serán asumidos por el comprador y el usuario y, hasta donde sea aplicable conforme a la ley pertinente, el comprador y el usuario aceptan eximir de responsabilidad a FMC y al vendedor de cualquier reclamo relacionado con dichos factores.

El vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los fines enunciados en las Instrucciones de uso si se lo utiliza de acuerdo con dichas instrucciones en condiciones normales de uso. EN LA MEDIDA QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEY PERTINENTE, FMC NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA SELECCIÓN, COMPRA O USO DE ESTE PRODUCTO. En la medida que sea compatible con la ley pertinente, cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, que se haya ofrecido resulta inaplicable si el producto se ha utilizado contrariamente a las instrucciones de la etiqueta, o en condiciones anormales, o en condiciones que no sean razonablemente predecibles (o que estén más allá del control del) vendedor o FMC, y el comprador asume el riesgo que implica cualquier uso de ese tipo.

En la medida que sea compatible con la ley pertinente, FMC ni el vendedor serán responsables de cualquier daño incidental, derivado o especial como resultado del uso o la manipulación de este producto. EN LA MEDIDA QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEY PERTINENTE, EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO O EL COMPRADOR, Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD LEGAL DE FMC Y EL VENDEDOR DE CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES BASADAS EN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, DAÑO LEGAL, RESPONSABILIDAD TERMINANTE U OTRA) COMO CONSECUENCIA DEL USO O LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO SERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A ELECCIÓN DE FMC O EL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. Estas Condiciones de venta y limitación de la garantía y responsabilidad legal no pueden modificarse mediante ningún acuerdo oral o escrito.