




Evento de Desarrollo Profesional de Evaluación de Caballos

Creado: 14

En equipo, revisen el material proporcionado y trabajen juntos para responder a las siguientes preguntas. Dispondrán de 10 minutos en esta estación. 10 puntos por pregunta.

Lee el siguiente escenario y responde a las preguntas basándote en la información proporcionada.

Dolly es una yegua que se lleva a los Servicios Veterinarios de Faith por cojera. Dolly presenta cojera bilateral de las extremidades anteriores. Está herrada en las 4 patas, con cuñas en las patas delanteras. Su línea de base es una cojera bilateral de grado $\frac{1}{2}$ en la extremidad anterior. Cuando se le lanza en círculo en ambas direcciones, se evidencia una cojera de grado $\frac{3}{4}$. Se aplicó un bloqueo nervioso palmo-digital diagnóstico en ambas extremidades anteriores, lo que provocó la desaparición de la cojera. A continuación se muestran sus radiografías. Dolly muestra que su ángulo palmar delantero izquierdo es de 2 grados y su ángulo palmar delantero derecho está a 4 grados.



- A. ¿Qué herramienta utilizaría el veterinario o el herrador para determinar si Dolly lleva actualmente la talla correcta de zapato de cuña?
- A. Yunque
 - B. Cuchillo para pezuñas
 - C. Medidor de pezuñas
 - D. Comprobadores de cascos



- B. Aunque Dolly lleva cuñas, presenta un ángulo palmar de 2 grados en la parte delantera izquierda y de 4 grados en la parte delantera derecha. ¿Cuál es el ángulo palmar ideal para caballos de alto rendimiento?
- A. -2 grados a -4 grados
 - B. 0 grados
 - C. 2 grados a 4 grados
 - D. Por encima de 10 grados
- C. Según la información y las radiografías proporcionadas, ¿qué hueso muestra mineralización/calcificación en la parte anterior izquierda? Identificado por el círculo rojo.
- A. Hueso del ataúd
 - B. Hueso navicular
 - C. Metacarpo largo
 - D. Hueso de cañón





- D. ¿Qué vista radiográfica se muestra arriba que el veterinario está utilizando para ayudar a diagnosticar a Dolly?
1. Latero-medial de la pezuña
 2. Dorsal-palmar de la pezuña
 3. Horizonte navicular
 4. Flexión lateral del carpo
- E. Los propietarios de Dolly han decidido inyectarle la articulación delantera izquierda del ataúd y comenzar una dosis diaria de Firocoxib 57 mg. ¿Cuántos días de reposo se recomiendan después de las inyecciones y qué tipo de medicación le han recetado?
- A. 10-12 días y medicación para la úlcera
 - B. 3-5 días y AINE
 - C. 3-5 días y medicación para la úlcera
 - D. 10-12 días y AINE